



RODERICK L. BREMBY, ລັດຖະມົນຕີ

K A N S A S

ກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ

KATHLEEN SEBELIUS, ຜັວງການລັດ

Q&A ກ່ຽວກັບໄຂ້ ຄົວ

ໄຂ້ ຄົວ ແມ່ນຫຍໍ້?

ໄຂ້ ຄົວແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກສັດ ຫີ້ສາມາດຕິດໄສ່ສັດໃນພາມ (ຫຳອິດແມ່ນແບ້, ແກະ ອົວ) ເຊັ່ນ ກັບສັດລົງອື່ນໆ ແມ່ວ, ໝາ, ຈຳພວກໝູ, ແລະ ນິກຈຳນວນນີ້. ພະຍາດສິ່ງຜ່ານຈາກບັກເຕີຂະນິດນີ້ຊື່ວ່າ ກາຊີໂອນ ລາ ບູມີຕີ (*Coxiella burnetti*). ຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນຂອງບັກເຕີສູງສຸດແມ່ນຢູ່ທີ່ຈຸລັງແຮ່ຂອງສັດ.

ໄຂ້ ຄົວ ລະບາດແນວໃດ?

ພະຍາດນີ້ຕິດເຊື້ອໂດຍຜ່ານການຫາຍໃຈເຂົ້າຂອງລະອອງຂອງແຫຼວນອ້ອຍງຸຂອງຈຸລັງ, ນັ້ນເມືອກຫຼືສິ່ງທີ່ຂັບຖ້າຍຂອງສັດທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼືໂດຍຕິ່ງຈາກການສໍາພັດວັບສິ່ງທີ່ນີ້ ເຊື້ອພະຍາດປິນເປົ້ອນ. ຈັບເນື້ອເຫຼື່ອຍລູກອ່ອນ ຫຼືຜະລິດຕະພັນແລກເລີ້ມທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກກັບສັດລົງມີຄວາມສົ່ງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ. ເສື້ອຜ້າເຕື່ອງນຸ່ງຖືອາດຈະກາຍເປັນບ່ອນປິນເປົ້ອນຈາກການເຮັດວຽກກັບສັດ ແລະ ມັນກໍເປັນມີຄວາມສາມາດເປັນແຫຼ່ງ ຕິດເຊື້ອເໝືອນກັນ.

ເນື້ອວ່າໄຂ້ ຄົວແມ່ນການຕິດເຊື້ອຈາກສັດໄສ່ຄົນ, ມັນບໍ່ແຜ່ເຊື້ອຈາກຄົນສູ່ຄົນ. ພຽງແຕ່ຄົນຜູ້ເຮັດວຽກໃກ້ສິດກັບສັດ ແລະ ເນື້ອເຍື່ອທຳມະດາຂອງສັດນີ້ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສົ່ງຂອງໄຂ້ ຄົວ.

ອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດແລະ ມັນວິວດົນປານໃດ?

ໄລຍະບຶ່ມຕົວຂອງໄຂ້ ຄົວທຳມະດາແລ້ວໃນໄລຍະສອງ ແລະ ສາມອາຫິດ ແຕ່ອາດຈະມີຂອບເຂດໃນ 9 ຫາ 39 ວັນ. ອາການເລີ້ມຕົ້ນມີໄຂ້ສູງ, ໝາວເຢັນ, ເຈັບຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ລ່ອຍແຂ່ງຂາ, ບໍ່ຢາກກິນເຂົ້າແລະ ໄຄຕ້າວອອກ.

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະ ການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຂີ່ວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຄີຣິດສ, ຖະໜົນ 1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເຄ ເອສ 66612-1368

ທາງໂທຣະສັບ 785-296-8605 ແນັກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ & ແດການສຸກສິນຂອງສາຫາວະນະ:

ໂທຣໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນັກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318

ອັກເສບປອດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເຕິ່ງກາງຂອງກໍາລະນີໄຂ້ ຄືວ, ແຕ່ກໍ່ອາດຈະວິວດໄປໂດຍບໍ່ມີອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ ໂອແລະເຈັບໜ້າເອິກ. ນັ້າທີ່ການຂອງຕັບປັ້ນປ່ວນແລະອາການອັກເສບຕັບແບບຮຸນແຮງຫຼືຊຳເຮື້ອອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ໃນກໍາລະນີທີ່ພົບໄດ້ຢາກ, ແມ່ນອາການທາງປະສາດອາດຈະມີໃນແມ່ນໍານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບໄຂ້ ຄືວແມ່ນຢູ່ໃນສະພາວະສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໃນລູກອ່ອນແລະສາມາລຸກໄດ້.

ໄຂ້ ຄືວອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດບໍ່?

ກໍລະນີໄຂ້ ຫົວຮຸນແຮງສ່ວນໃຫຍ່ (ມີພະຍາດທີ່ບໍ່ມີອາການຍາວນານ) ບິນປົວຄົນໃໝ່ໄດ້ບໍ່ມີການບິນປົວ. ອັດຕາການຕາຍຈາກໄຂ້ ຄືວເກີດຂຶ້ນປະມານ 1 ເປີເຊັ່ນຂອງກໍາລະນີທີ່ບໍ່ມີການບິນປົວ. ມັນເກີດຂຶ້ນສ່ວນໜ້ອຍກັບບາງຄົນເທົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບິນປົວສໍາລັບໄຂ້ ຄືວທີ່ຮຸນແຮງແລະເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ ຄືວທີ່ຮຸນແຮງ ອາດຈະວິວດໄປເຖິງຮູບແບບຊຳເຮື້ອ (ບ່ອນທີ່ບັນຫາສຸຂະພາບເກີດຂຶ້ນຍາວນານ) ໄກ້ຈະຮອດນິ່ງປີ ຫຼືຍາວນານເຫົ່າ ກັບ 20 ປີຫຼູ້ຈາກທີ່ມີການລະບາດຕັ້ງທໍາອິດ. ຄວາມຕາຍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຖິງ 65 ເປີເຊັ່ນຂອງກໍາລະນີໄຂ້ ຄືວຊຳເຮື້ອ. ການປິນປົວດ້ວຍຢາຕ້າມເຊື້ອແມ່ນແນະນຳສໍາລັບກໍາລະນີເປັນໄຂ້ ຄືວຊຳເຮື້ອ.

ສາມາດປ້ອງກັນໄຂ້ ຄືວໄດ້ແນວໃດ?

ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ ເຊິ່ງສາມາດໄກ້ກັບເນື້ອເຫັນອຂອງສັດ ເຊັ່ນວ່າ ສັດຕະວະແພດ, ຊາວນາ, ພະນັກງານຫ້ອງວິໄຈຫຼືໂຮງຂ້າສັດ ຄວນຈະຕ້ອງລັງມີຫຼືອາບນີ້ໃຫ້ສະອາດພາຍຫຼັງເຮັດວຽກກັບສັດ. ເຄື່ອງນຸ່ງຄວນຫ້ອຍໄວ້ແລະຂັກ ຈະສາມາດປ້ອງກັນລະເຫີຍຂອງລະອອງຂອງແຫຼວງ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອ. ຈະຕ້ອງຈີ່ໄວ້ວ່າບັກເຕີນັ້ນສາມາດພາໃຫ້ເກີດໄຂ້ ຄືວແມ່ນທຶນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະຢາຂ້າພະຍາດໝາຍຍ່າງ.

ວັກຊືນທີ່ກວດສອບແມ່ນມີເວີ້ຫຼັບຖຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີວຽກກ່ຽວພັນກັບຄວາມສູງສໍາລັບ ໄຂ້ ຄືວ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີວັກຊືນໄວ້ສໍາລັບທີ່ໄປ. ຄວາມສູງຕໍ່ຜົນກະທີ່ບໍຂອງວັກຊືນມີໝາຍກວ່າຄວາມສູງຂອງການຕິດພະຍາດໄຂ້ ຄືວໃນຄົນທີ່ວໄປ. ການທິດສອບທາງຜົວໜ້າຕ້ອງເຮັດກ່ອນການຕັດສິນໃຈໃຊ້ວັກຊືນນັ້ນ.

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຊີວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຮັດຕິດສ, ຖະໜົນ1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເອສ 66612-1368

ທາງໂທຣະສັບ 785-296-8605 ແນັກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ& ເຫດການສຸກສິນຂອງສາຫະນະ:

ໂທຣໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນັກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318